Rapport de santé

1

BRAUNVIEH +

Date du contrôle	26.02.2019	Arrivée de l'échantillon	27.02.2019
Exploitation	[redacted]	Date de l'examen	27.02.2019
Abonnement	CS 150/350	Période statistique	01.01.2018 - 31.12.2018

2

Chiffres sur le troupeau	Nombre	Moyenne annuelle
• Animaux sous EPL	40	40.6
• Animaux en phase de production	35	32.3
• Primipare en phase de démarrage	1	2.8
• Vaches avec 1. CL après tarissement	3	2.8

3

Chiffres sur la santé	Nombre de vaches	% de vaches CL actuel	Moyenne anuelle	Meilleurs 25% toutes exploitations	Base de données
Animaux avec des pis sains					
• Animaux avec moins de 150 CS	27	67.5%	71.4%	80.8%	EPL
Animaux suspects					
• Animaux avec plus de 150 CS	13	32.5%	28.6%	18.9%	EPL
• Animaux avec plus de 350 CS	2	5.0%	8.1%	5.4%	EPL
Période de tarissement / transition					
• Animaux guéris dont les CS inf. à 150 dernier CL préc. lact. CS sup. à 150	0	0.0%	28.6%	43.0%	EPL
• nouvellement infectés CS plus de 150 dernier CL préc. lact. CS inf. à 150	2	66.7%	3.6%	0.0%	EPL
• nouvellement infectés CS plus de 350 dernier CL inf. lact. préc. CS inf. à 350	2	66.7%	3.6%	0.0%	EPL
Phase de démarrage primipares					
• CS légèrement élevée: plus de 150	1	100.0%	14.3%	0.0%	EPL
• CS très élevées: plus de 350	0	0.0%	7.1%	0.0%	EPL
Animaux suspects phase de production					
• CS légèrement élevées: plus de 150	9	25.7%	32.8%	20.2%	EPL
• CS très élevées: plus de 350	0	0.0%	8.4%	5.1%	EPL
Animaux chroniquement suspects					
• Animaux min. 150 CS 3 derniers CL	5	14.3%	12.7%	7.0%	EPL
• Animaux min. 350 CS 3 derniers CL	0	0.0%	2.2%	0.0%	EPL
Journal des traitements					
• Résultats mammite				0.7%	EDS

Profil cellules



Aide pour l'interprétation du rapport de santé

1. Les chiffres clés et les mesures ou conseils sont toujours calculés dans le rapport de santé grâce à deux valeurs limites. De plus, il est possible de choisir entre l'abonnement 100/200 ou 150/350. Dans l'abonnement de santé 100/200, la valeur limite d'un pis en bonne santé est de maximum 100. Les animaux qui se trouvent entre 100 et 200 sont considérés comme suspects. Les vaches avec des cellules en dessus de 200 sont considérées comme vaches à problème. Dans l'abonnement 150/350, la valeur limite inférieure des cellules est de 150 et la valeur supérieure se situe à 350.

2. **Chiffres du troupeau**
   - **Vache avec EPL actuelle :** tous les animaux du dernier contrôle laitier
   - **Dont en phase de production :** Vaches après le 75ème jour de lactation
   - **Dont primipare en phase de démarrage :** vaches dans les 75 premiers jours de la première lactation.
   - **Dont vaches en 2 et + lact. avec 1 EPL :** vaches multipares au premier contrôle laitier.
3. **Chiffres de la santé**
   - **Animaux guéris :** vaches multipares qui montrent une bonne santé du pis après le premier contrôle laitier après vêlage et qui avaient un haut taux de cellules avant le tarissement → Stratégie de tarissement réussie
   - **Animaux nouv. infectés** : vaches multipares qui montrent un haut taux cellulaire au premier contrôle laitier après vêlage et qui avaient un pis sain avant le tarissement → Problème lors du tarissement, la phase de transition ou de démarrage.
   - **CS légèrement/très élevées :** vaches à haut taux cellulaire. Légèrement élevées signifie qu'elle se situe dans la zone entre les deux valeurs limites de l'abonnement. Très élevées signifie qu'elle se situe en dessus de la limite supérieure.
   - **Animaux suspects chroniques :** Vaches qui ont des cellules légèrement ou très élevées lors des 3 derniers contrôles laitiers.
   - **Meilleurs 25% toutes exploitations :** c'est une mesure de comparaison : c'est la limite inférieure du meilleur quart de toutes les exploitations sous EPL.
   - **Base des données EPL :** l'évaluation se base sur le résultat du contrôle laitier.
   - **Base des données EDS :** l'évaluation se base sur la saisie des données de santé dans le journal des traitements.
4. **Profil cellules**
   - Les derniers contrôles laitiers de l'exploitation sont illustrés.
   - Les colonnes montrent le pourcentage de vaches suspectes (clair) et le pourcentage de vaches à haut taux cellulaire (foncé). La référence est l'axe de gauche.
   - Les cellules somatiques théoriques du tank sont exposées sous forme de ligne avec des points. La référence est l'axe de droite. Lors de cellules au-dessus de 500 le point est fixé à 500 et est inscrit en rouge sur le graphique.

Evolution de la santé de la mamelle durant la lactation



x Vaches en 2ème lactation ou plus
o Vaches en première lactation

5

Evolution de la santé de la mamelle durant la phase de tarissement



x Vaches avec 2 pesées ou plus
o Vaches avec 1 pesée

6

5. Evolution de la santé de la mamelle durant la lactation

- Le graphique montre les cellules du contrôle laitier actuel et du dernier contrôle de toutes les vaches. L'état de la santé des pis de tout le troupeau du dernier mois peut ainsi être observé en un coup d'œil. Les primipares sont indiquées grâce à des cercles et les multipares grâce à des croix.

6. Evolution de la santé de la mamelle lors de la phase de tarissement

- Le graphique montre les cellules somatiques du premier contrôle de la lactation actuelle et les cellules de la dernière pesée de la lactation précédente pour toutes les multipares. Les vaches fraîches vêlées sont montrées par des cercles lors de leur première pesée. Les vaches à partir de la deuxième pesée sont montrées par des croix.
- Ce graphique montre non seulement l'évolution de la santé des pis des vaches qui ont une première pesée après la phase de tarissement mais également l'évolution de la santé du pis des vaches lors de la phase de tarissement sur l'exploitation. Le taux de réussite de la phase de tarissement, de transition et de démarrage peut être estimé en un coup d'œil. Cela donne une vue d'ensemble sur tout le troupeau.

Animaux suspects: Mesures recommandées

7

Nom N° BDTA	Date vêl.	Lact. Jours	Lait kg Actuel	Der. EPL	Av-der. EPL	Cellules Actuel	Der. EPL	Av-der. EPL	Mesures
[redacted] CH 120.[redacted]	03.08.2018	6 171	33.2	28.6	33.8	174	39	193	Pesée suspecte: réaliser test de schalm. Si positif, MID recommandé.
[redacted] CH 120.[redacted]	03.01.2018	5 383	11.3	14.4	22.8	200	223	118	Cas chronique suspecté. MID nécessaire.
[redacted] CH 120.[redacted]	05.03.2018	3 322	29.2	19	31.8	133	157	40	Deuxième pesée suspecte: réaliser test de schalm, si positif, MID recommandé.
[redacted] CH 120.[redacted]	03.03.2018	2 324	16.9	11.1	23.7	196	495	89	Pesée suspecte après le diagnostic "mammite" dans le journal des traitements: réaliser le test de schalm. Si positif, MID recommandée.
[redacted] CH 120.[redacted]	19.04.2018	7 277	28.4	31	26.8	221	171	226	Cellules fortement augmentées: réaliser le test de schalm, MID recommandée.
[redacted] CH 120.[redacted]	20.11.2018	1 62	27	27.7		155	39		Pesée suspecte: réaliser test de schalm. Si positif, MID recommandé.

7. Animaux suspects : mesures recommandées

- Les mesures sont calculées en fonction des cellules des trois derniers contrôles laitiers, des données de santé dans le journal des traitements et des résultats MID disponibles. Les animaux qui ont des pis sains ne sont pas listés.
- Les mesures possibles sont inscrites dans le tableau suivant. Il est également indiqué dans quels cas un formulaire MID est imprimé.

Mesures	Formulaire de commande MID
Pesée suspecte : réaliser test de Schalm. Si positif, discuter de l'analyse MID disponible : evt. Définir des mesures.	Non
Cellules fortement augmentées : réaliser test de Schalm et discuter de l'analyse MID disponible avec vétérinaire : définir des mesures.	Non
Pesée suspecte après le diagnostic "mammite" dans le journal des traitements : réaliser le test de Schalm. Si positif, MID recommandée.	Oui
Cellules fortement augmentées après diagnostic "mammite" dans le journal des traitements : MID recommandé.	Oui
Pesée suspecte : réaliser test de Schalm. Si positif, MID recommandée.	Non
Deuxième pesée suspecte : réaliser test de Schalm, si positif, MID recommandée.	Non
Troisième pesée suspecte : MID recommandée.	Oui
Pesée suspecte après augmentation forte des cellules : MID recommandée.	Oui
Cellules augmentées fortement : réaliser test de Schalm. Si positif, MID recommandée.	Oui
Cellules fortement augmentées : réaliser le test de Schalm, MID recommandée.	Oui
Cellules fortement augmentées (répétitif): réaliser test de schalm, MID nécessaire.	Oui
Cas chronique suspecté. MID nécessaire.	Oui

Mesures de tarissement recommandées pour les vaches avec dernière IA enregistrée > 200 jours

Nom N° BDTA	Date vêl.	Lact. Jours de gestation	Lait kg	Jour	Cellules			Mesures
					Actuel	Der. EPL	Av-der. EPL	
[redacted]	18.01.2018	8	26.4	368	204	81	33	Analyse MID nécessaire, stratégie de tarissement à discuter avec vétérinaire, tarissement avec antibiotiques recommandé
CH 120.[redacted]		207						

8

8. Mesures de tarissement recommandées pour les vaches avec dernière IA enregistrée >200 jours

- Les mesures sont calculées en fonction des cellules des trois derniers contrôles laitiers, des données de santé dans le journal des traitements et des résultats MID disponibles. Tous les animaux qui ont une durée de gestation plus longue que 200 jours sont listés.
- Les mesures possibles sont inscrites dans le tableau suivant. Il est également indiqué dans quels cas un formulaire MID est imprimé.

Mesures	Formulaire de commande MID
Tarissement sans antibiotiques possible	Non
Tarissement sans antibiotiques possible, Analyse MID à discuter avec vétérinaire	Non
Analyse MID recommandée, stratégie de tarissement à discuter avec vétérinaire	Oui
Analyse MID nécessaire, stratégie de tarissement à discuter avec vétérinaire	Oui
Analyse MID nécessaire, stratégie de tarissement à discuter avec vétérinaire, tarissement avec antibiotiques recommandé	Oui
Analyse MID disponible, stratégie de tarissement à discuter avec vétérinaire	Non
Analyse MID disponible, stratégie de tarissement à discuter avec vétérinaire, tarissement avec antibiotiques recommandé	Non